

Czy to jest bezpieczne?

Oczywiście.

Dawca przez cały proces immunizacji jest objęty opieką lekarską. Zarówno do szczepień, jak i przy oddawaniu osocza metodą plazmaferezy stosowany jest sprzęt jednorazowego użytku.

Co w przypadku, gdy opuszczę planowane pobranie osocza?

Osocze może być oddawane co 2 tygodnie, jednak zdarza się sytuacja, że dawca nie może przybyć w wyznaczonym terminie. W takich przypadkach planowany jest nowy indywidualny termin przybycia dawcy.

Czy przysługuje mi zwolnienie z pracy na dni szczepienia i oddania osocza?

Tak, oczywiście.

Czy to boli?

Ból przy szczepieniu oraz przy oddawaniu osocza jest związany tylko i wyłącznie z momentem wkucia igły. Cały proces jest bezbolesny.

Ile trwa cała wizyta z pobraniem osocza immunizowanego?

Czas samego procesu oddania osocza immunizowanego metodą plazmaferezy to ok. 30-40 min. Trzeba dodatkowo zarezerwować sobie czas na rejestrację oraz kwalifikację lekarską.

Najczęściej zadawane pytania ???

Czy i kiedy mogę zrezygnować?

Zrezygnować można na każdym etapie immunizacji. Jednak pamiętaj, że pokładamy w tobie ogromną nadzieję pomocy innym.

Dlaczego osocze immunizowane jest takie ważne?

Ponieważ **tylko** z osocza od dawców immunizowanych uzyskuje się immunoglobulinę anti-RhD, która chroni kobiety zagrożone konfliktem serologicznym, mogącym skutkować śmiercią dziecka.


Kiedy mogę się zgłosić?

Zawsze! Swoją chęć można zgłosić w każdej chwili! Zarówno osobom z personelu medycznego na poziomie rejestracji, lekarzom w gabinecie, jak również telefonicznie. Odpowiemy na każde nurtujące pytanie i osobiście wytłumaczymy cały proces immunizacji.

W przypadku dodatkowych pytań jesteśmy do dyspozycji.

DAWCY IMMUNIZOWANI ratują życie noworodków! Chcesz zostać jednym z nich?

Możesz zostać DAWCĄ IMMUNIZOWANYM, jeżeli:



masz grupę krwi:
O, A, B, AB
RhD-(ujemny)



i.. chcesz pomóc



jesteś mężczyzną lub kobietą po okresie menopauzy

Naprawdę możesz pomóc!

Kobiety ciężarne z grupą krwi RhD-(ujemną) są zagrożone konfliktem serologicznym. Jest on niebezpieczny, ponieważ może skutkować poważną chorobą, a nawet śmiercią dziecka.

Aby kobiety te rodziły zdrowe dzieci potrzebna jest twoja pomoc!!

Osocze dawców immunizowanych jest jedynym źródłem immunoglobuliny anti-RhD, która chroni przed rozwojem choroby hemolitycznej płodu i noworodka.

Zgłoś się już dziś, zostań dawcą immunizowanym i zacznijmy razem pomagać !!!

INFORMACJA:

Dawcom za oddawanie osocza immunizowanego należy się **REKOMPENSATA PIENIĘŻNA**, której wysokość reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2017r.

Zainteresowani dawcy, którzy chcą dołączyć do grona naszych stałych dawców immunizowanych proszeni są o osobisty lub telefoniczny kontakt z RCKIK w Kaliszu (62 767-94-37; 62 767-94-06)

Chętnie odpowiemy na pytania i udzielimy dodatkowych informacji.

!! Zapraszamy !!



Czym jest immunoglobulina anti-RhD?

Jest to przeciwciało produkowane przez układ immunologiczny człowieka, skierowane przeciwko antygenowi D z układu Rh znajdującemu się na krwinkach czerwonych człowieka z grupą krwi RhD+(dodatni).

W momencie, gdy osoba (np. kobieta w ciąży) z grupą krwi RhD-(ujemny), będzie miała kontakt z krwinkami czerwonymi (dziecka) grupy krwi RhD+(dodatni) jej układ immunologiczny rozpozna je jako „obce” i organizm będzie usiłował je zniszczyć!!

Jeżeli osoba ta otrzyma odpowiednią dawkę ludzkiej immunoglobuliny anti-RhD, której **jedynym źródłem jest osocze dawców immunizowanych**, może zapobiec to jej immunizacji! Zawarte w leku immunoglobuliny anti-RhD niszczą obce krwinki czerwone RhD+(dodatnie), a układ immunologiczny kobiety nie zostanie pobudzony do wytworzenia własnych przeciwciał anti-RhD.

Zastosowanie immunoglobuliny anti-RhD:

Wśród kobiet ciężarnych z grupą krwi RhD-(ujemną) w celu uniknięcia choroby hemolitycznej płodu i noworodka

U biorców krwi grupy RhD-(ujemnej), którym podano transfuzję RhD+(dodatniej) krwi

Droga do zostania dawcą immunizowanym w RCKiK w Kaliszu



Mężczyzna / Kobieta po okresie menopauzy
z grupą krwi:
O RhD-(ujemny)
A RhD-(ujemny)
B RhD-(ujemny)
AB RhD-(ujemny)

Kwalifikacja przez lekarza
w RCKiK Kalisz

Szczepienia
Badania kontrolne

Wytworzenie
przeciwciał anti-D
z układu Rh

Niewytworzenie
przeciwciał anti-D
z układu Rh

Rozpoczęcie
cyklicznego
pobrania osocza
immunizowanego
od dawcy

Jeżeli dawca nie wytworzy przeciwciał anti-D rezygnuje się z dalszego uodparniania. Krwiodawca może od tej chwili oddawać krew lub osocze dla celów leczniczych pod warunkiem kontroli obecności przeciwciał w RCKiK przed każdym oddaniem w ciągu roku od ostatniego szczepienia.